

使用“0号胶囊”致幻后一同性恋者坠亡

古今平 周品涛 魏英率 付英男

(武汉市公安局东新分局, 湖北 武汉 430074)

摘要 “0号胶囊”主要成分是5-MeO-DIPT (5-甲氧基-N,N-二异丙基色胺) 是一种新型毒品属色胺衍生物, 俗称火狐狸、媚药, 使用后会产生迷幻效应, 毒副作用包括瞳孔放大、恶心、下颚紧闭、肌肉紧张过度、高血压及心跳过速等症状。根据国外文献记载, 有一位29岁男子为寻找性乐趣而使用5-MeO-DIPT, 导致急性心脏衰竭死亡。另有多数案例均证实5-MeO-DIPT具有潜在致命性危险, 国内鲜有使用后直接致死案例。本文报道一名21岁男性大学生因使用“0号胶囊”产生被迫害幻觉后从16楼窗户跳出坠亡的事件, 藉此促使社会各界对该药物之危害性提高警觉。

关键词 0号胶囊 5-MeO-DIPT 火狐狸 迷幻剂 致死危险

1 案例资料

1.1 简要案情

某年9月18日3时许, 陈某打110报警称, 有人从他所住的16楼房间窗户跳出坠落楼下。接报后在该小区楼下发现一具男性尸体, 全身赤裸, 身上有多处严重开放性损伤, 创口见大量血液流出。陈某房间内发现死者的衣物及身份证、学生证等物品。床上物品凌乱, 床垫上发现散在擦拭状血迹, 床边地面见散落的鼠标及键盘, 翻倒的花盘。卫生间有大量水渍, 淋浴花洒手柄断裂。床头柜抽屉内发现印有“ZERO capsule”(0号胶囊)字样的棕色小药瓶(见图1), 其内仍有3粒灰色胶囊。卧室窗扇呈开启状, 窗扇下沿距窗台40cm, 窗玻璃上发现掌纹, 窗台上发现赤足印; 经检验比对为死者杨某所留。经查死者为杨某, 系某经济学院在校本科生, 陈某当晚通过同性恋交友平台邀约杨某至其住所进行性活动。为寻求刺激陈某将1粒网购的“0号胶囊”交给杨某, 说服杨某塞入其肛门, 数分钟后杨某即开始出现不可控制的便意, 感觉异常, 体温升高, 心跳加速等不适, 陈某见状将杨某带入卫生间给杨某洗澡, 用淋浴头冲洗肛门, 欲缓解该药带来的不良反

应。然而杨某的不良症状并没有消退, 随后出现躁狂及迫害幻想, 感觉陈某欲加害他。在陈某欲对杨某进行肢体控制时, 杨某出现剧烈反抗。摆脱陈某后, 杨某从卫生间冲出, 打开大门全裸着跑进楼道。陈某见状拼命将其拉回房间。杨某在房间里乱喊乱跳, 几番挣扎后摆脱陈某的控制, 跳上卧室窗台从16楼窗口跳出坠于楼下。



图1 现场发现的“0号胶囊”药瓶

1.2 尸体检验

青年男性尸体, 尸长172cm, 双眼眼睑结膜苍白。口鼻腔、双侧外耳道见血液流出。面颅骨多发性骨折, 胸部25cm×12cm的范围内见片状的擦伤, 对应处肋骨多发性骨折。左肱骨骨折。臀部见直径为5.5cm的类圆环形皮下出血, 其内见片状擦伤。左右大腿根部见8cm×7cm、10cm×6cm裂创。肛门松弛呈漏斗状。会阴部见8cm×6cm的裂创。左膝下11cm×4.5cm的

范围内见擦挫伤。左大腿股骨骨折，骨折处见8.5cm×2.5cm的裂创。右股骨下端骨折，骨折断端刺破肌肉皮肤在右大腿下段形成3.5cm×3.2cm的裂创。右小腿中段骨折。

解剖检验：颅骨粉碎性骨折，枕部脑组织挫伤出血，左第6~9肋骨锁骨中线处骨折，右第5~8肋骨锁骨中线处骨折，双肺叶表面见散在出血；双肺近肺门处见撕裂创；心包近动脉弓处撕裂，心脏表面见散在出血点；肝脏右叶挫碎，脾门、左肾门处浆膜下出血，腹腔积血1500mL。实验室检查，送检的死者血液及现场提取的“0号胶囊”中检出5-甲氧基-N,N-二异丙基色胺，未检出其他常见毒物、酒精及安眠药。如图2所示。




图2 5-MeO-DIPT的分子式结构图

2 讨论

根据尸检情况，杨某系因高坠致严重颅脑损伤合并胸腹腔脏器损伤死亡。

现场勘验情况证实当时两人在室内有打斗情况。窗台及窗玻璃上遗留痕迹符合杨某自主跳窗坠楼。

杨某体内检出的5-甲氧基-N,N-二异丙基色胺是“0号胶囊”的主要成分即5-MeO-DIPT是由Shulgin和Carter于1980年人工合成的具有迷幻作用的色胺衍生物^[1]。许多的色胺类化合物以其强烈的致幻作用而闻名，如来自致幻蘑菇的赛洛西宾（Psilocybin）、赛洛新（Psilocin）和来俗称“死藤水”的二甲基色胺（DMT）。服用后能使人产生致幻作用，产生时间和空间的变形和幻觉。其最早是北美洲的印第安人在宗教祭祀中使用，后因其使人产生欣快感而逐渐被滥用^[2]。5-MeO-DIPT自1999年起被称为“FOXY”，在美国年轻人当中作为“party drug”开始被滥用，随后扩大到其他国家^[3]。近年该药流入我国，有“火狐狸”“媚药”之称。作为SDU（情色药物）在年轻人尤

其是同性恋者中流行，被商家制成胶囊或注射液通过互联网销售（见图3）。因多为男性同性恋者的女性角色（0号）所以又被称为“0号胶囊”“G点液”、犀牛液。商家对它的宣传：纯植物萃取精华，用于提高0号角色的局部快感和敏感神经。据研究5-MeO-DIPT通过选择性地影响5-羟色胺（5-HT）能系统产生中枢作用，使体温，皮质酮及行为产生改变，随之会产生迷幻现象，触觉、听觉、视觉发生扭曲；其他毒副作用包括瞳孔放大、恶心、下颚紧闭、肌肉紧张过度、高血压及心跳过速等症状。2006年报道了一名29岁男性因经肛门注入过量的“FOXY”溶液导致神经性中毒引发急性心力衰竭死亡的案例。因其潜藏之致命危险性，2015年列入我国非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录。另外因使用者很快出现迷幻现象，导致认知障碍，丧失防护意识，使用安全套及PrEP大幅降低，性病及HIV感染风险急剧增加。



图3 “0号胶囊”的各种网购样品

虽国内尚未有中毒致死案例报道，商家往往隐瞒“0号胶囊”的主要成分及其严重的毒副作用，使用者难以认识其危害性。本例因使用者产生的迷幻作用而坠楼身亡，故社会各界对该药物滥用的社会危害性应提高警觉。

参考文献：

- [1] A. T. Shulgin, M. F. Carter. N, N-diisopropyl tryptamine (DIPT) and 5-methoxy-N, N-diisopropyltryptamine (5-MeO-DIPT), two orally active tryptamine analogs with CNS activity, *Commun[J]. Psychopharmacol*, 1980: 363-369.
- [2] 王柔嘉, 向平, 于治国, 等. 色胺类新精神活性物质的研究进展[J]. *中国司法鉴定*, 2019(4): 43-55.
- [3] Wilson John M, McGeorge Frank, Smolinske Susan, et al. A foxy intoxication[J]. *Foren sic science international*, 2005, 148(1): 31-36.